

# Schemat postępowania u kotów w przypadku zatrucia pyretroidami.

## 1. Należy wykąpać kota, używając delikatnego detergentu

## 2. W przypadku występowania drgawek

- Diazepam 0,2-2,0 mg/kg i.v, lub Metokarbamol 55-220 mg/kg i.v (nie przekraczać maksymalnej szybkości podawania 200 mg/min)

Jeśli brak poprawy

- Fenobarbital 6 mg/kg powoli i.v, lub
- Pentobarbital 4-20 mg/kg powoli i.v

## 3. W przypadku połknięcia przez kota substancji z grupy pyretroidów

- Węgiel aktywny 2g/kg, lub
- Siarczan magnezu ( 0,5-1,0 g/kg, roztwór 6% podawany za pomocą sondy żołądkowej) lub
- Siarczan sodu (0,5-1,0 g/kg, roztwór 4% podawany za pomocą sondy żołądkowej)

## 4. W przypadku występowania objawów nadmiernego ślinienia się

- Atropina 0,1 mg/kg i.v. powtórzyć w razie braku efektu

## 5. W przypadku występowania wymiotów lub/i biegunki

- Osiągnięcie równowagi wodno-elektrolitowej
- Kontrola i utrzymanie normalnej temperatury ciała
- Ochrona wątroby - Chlorek wapnia (2-10 ml i.v)
- Witamina B-complex i.m.



Teksty źródłowe:

[www.vetpharm.uzh.ch](http://www.vetpharm.uzh.ch); [www.vetpharm.uzh.ch](http://www.vetpharm.uzh.ch)

MemoVet (W.Kraft): „Dosierungsvorschläge für Arzneimittel bei Hund und Katze”

Verlag: Schattauer GmbH, 4 Auflage 2005